

# Épointer les dents des porcelets

Colonne réservée au formateur

## PREPARATION

- 1 S'assurer que l'ont dispose du matériel médical suivant:
  - Une petite boîte et une solution antiseptique ou de l'alcool à 70°
  - Une brosse à dents
  - Une pince coupante
  - Un spray d'iode diluée

***Si la pince coupante à déjà servi, elle doit être réservée pour cette procédure et ne pas être utilisée pour la section des queues\* ou le soin du cordon ombilical\****
- 2 Vérifier l'état de la pince et l'absence de jour entre les parties coupantes. Si elle est endommagée, remplacer la par une nouvelle pair
- 3 Si la pince est sale, la brosser avec de l'eau chaude et savonneuse et la placer dans une boîte de solution antiseptique ou d'alcool à 70°
- 4 Identifier les portées qui requièrent un époinçage des dents ou continuer à partir des autres procédures
- 5 Se laver les mains soigneusement

## PROCEDURE

- Cette procédure suppose que l'opérateur est droitier*
- 1 Saisir soigneusement porcelets pour les placer dans une boîte sans fond ou un container. ***Prendre garde à la truie!***
  - 2 Attraper le porcelet dans la main gauche et placer le pouce dans le pli derrière l'oreille droite du porcelet
  - 3 Doucement, introduire le premier ou le deuxième doigt dans la bouche et tenir la bouche ouverte et maintenir la langue en bas
  - 4 Mettre les doigts restants sous le corps et le cou du porcelet pour le porter. Le second ou troisième doigt peut être délicatement introduit dans la gorge du porcelet pour éviter les cris.
  - 5 Incliner sur le coté la tête du porcelet suivant votre préférence.



# Épointer les dents des porcelets

Colonne réservée au formateur

## PROCEDURE (suite)

6

- ➔ Placer la pince sur une pair de dents et en parallèle à l'os de la mâchoire
- ➔ Fermer rapidement et fermement la pince pour couper proprement la dent près de la gencive.

7

Répéter l'opération pour les trois pairs de dents suivantes et faire attention à ne pas causer de dommage à la gencive, à la langue ou à toute autre partie de la bouche.

8

Passer un doigt sur la partie qui a été supprimer pour s'assurer qu'il ne reste pas de morceaux ou de bords pointus.

9

Si il y a des bords pointus, les couper avec la pince.

10

Marquer le porcelet et le replacer dans la case de mise bas ou continuer avec une autre opération

11

Tremper la pince dans une solution antiseptique ou de l'alcool à 70°et si nécessaire la débarrasser des débris avec une brosse à dents.

12

Répéter cette opération avec toute la portée, en laissant les petits et les faibles qui seront épointer plus tard pour qu'ils vivent. Marquer les faibles selon le **chapitre marquer des porcs**.

13

Noter sous *dents* dans la section *soins* de **la carte de mise bas** que les dents de la portée ont été épointées et faire une note pour les porcelets faibles ou petits qui doivent encore l'être.

14

Nettoyer la pince et passer à la portée suivante.

15

Une fois toutes les opérations réalisées pour chaque portée, suivre la procédure **Nettoyer le plateau médical**



## Domaine d'activité: **Épointer les dents des porcelets**

### Remarques pour le formateur

Le manuel technique du porc PPT suppose que l'épointage des dents est effectué en même temps que le marquage à l'oreille par entailles★ ou par tatouage★ et **les soins du cordon ombilical** 6 à 24 heures après la mise bas. Effectuer d'autres procédures tels l'injection de fer★, la section de la queue★ ou la castration★ est extrêmement stressant pour le porcelet et peut augmenter la mortalité avant le sevrage. Le manuel technique du porc PPT recommande que ces autres opérations soient effectuées à 3 jours.

Il est préférable de permettre au stagiaire de se concentrer uniquement sur une procédure à la fois. Le formateur terminera l'ensemble des soins sur les porcelets. Le stagiaire peut prendre la responsabilité de plusieurs procédures quand sa compétence pour chacune est reconnue.

### Préparation

Assister le stagiaire pour la vérification du matériel médical nécessaire et l'identification des portées dont les dents doivent être épointées.

### Équipement nécessaire

- Une portée qui est née depuis plus de six heures
- Une petite boîte et une solution antiseptique ou de l'alcool à 70
- Une brosse à dents
- Une pince coupante ou un cautérisateur à gaz
- Un spray ou crayon gras

***Si la pince coupante a déjà servi, elle doit être réservée pour cette procédure et ne pas être utilisée pour l'épointage des dents★ ou le soin du cordon ombilical★***

### Objectif

Enlever les canines des porcelets nouveaux nés pour limiter les risques d'infections



## Domaine d'activité: **Épointer les dents des porcelets**

### **Justification**

Expliquer au stagiaire:

- Les canines des porcelets sont vraiment pointue à la naissance
- Elles peuvent blesser la tête des autres porcelets les luttes pour établir l'ordre d'accès aux tétines. Ces blessures peuvent être le départ d'une infection tels la maladie graisseuse des porcs
- Elles peuvent aussi durement blesser la tétine ou la mamelle de la truie et la rendre douloureuse. La truie s'agite, peut refuser d'allaiter la portée, écraser des porcelets ou avoir un comportement de cannibalisme

### **Expliquer les mesures de sécurité**

- **Prendre garde à la truie** qui peut s'agiter lorsque les porcelets sont saisis pour être placés dans une boîte sans fond ou un container
- **Les morceaux de dents peuvent voler et entrer dans l'œil d'une personne.** Il est recommandé de mettre la tête en arrière ou de porter des lunettes de protection lors de l'épointage des dents

### **Expliquer la procédure**

- Expliquer, progressivement, la feuille de procédure au stagiaire
- Encourager les questions

### **Expliquer les points importants**

Souligner les aspects clés de la procédure et les expliquer

Demander au stagiaire pourquoi il/elle pense que c'est important

- Timing: Les dents doivent être épointer avant 24 heures post-partum mais jamais avant 6 heures ou avant que les porcelets n'aient ingérés suffisamment de colostrum.
- Porcelets petits et faibles: L'opération doit être retardée jusqu'à trois jours pour les porcelets petits et faibles.



## Domaine d'activité: **Épointer les dents des porcelets**

### **Expliquer les points importants (suite)**

- Hygiène: La pince doit être nettoyée avec de l'eau savonneuse et chaude avant et après usage et doit être rangée dans une solution antiseptique ou de l'alcool à 70°. Elle doit être trempée dans une solution antiseptique ou de l'alcool à 70° entre chaque porcelet. Les dents peuvent être cassées ou fendus par une pince émoussée ou endommagée. La pince doit être pointue, en bon état et doit être remplacée régulièrement
- Minimiser les dommages dans la bouche des porcelets: La pince doit être tenue parallèle à la mâchoire et il faut faire attention de ne pas blesser la gencive, la langue ou la bouche du porcelet. Insister sur le fait qu'une mauvaise technique peut induire une infection de la gencive et aussi augmenter l'incidence des méningites et autres maladies
- Enregistrement: noter dans la section soins de la carte de mise bas que les dents de la portée ont été épointées et marquer les porcelets faibles ou petits qui doivent encore l'être

### **Démarche pédagogique**

Montrer pas à pas au stagiaire la manière de procéder. Expliquer ce que vous faites et suivre exactement la procédure. S'assurer que le stagiaire observe attentivement et comprend ce qui est fait

### **Questions**

Répondre à toutes les questions au sujet de la procédure

### **Rôle du stagiaire**

Laisser le stagiaire tenir la pince dans la main de son choix. Demander au stagiaire de réaliser l'ensemble de la procédure, en l'aidant suivant les indications du paragraphe niveau de compétence attendu.

### **Niveau de compétence attendu**

1. Donner des instructions détaillées étape par étape au cours de toute la procédure
2. Donner des indications seulement quand il le demande ou quand un problème se pose.
3. Ne pas donner de direction : le stagiaire décrit ce qu'il fait durant la procédure



## Domaine d'activité: **Epointer les dents des porcelets**

### **Discussion**

- Contrôler chaque étape dans la feuille de procédure
- Comment le stagiaire ressent ce qu'il fait ?
- Quelle partie de la procédure était oubliée ou posait problème?

### **Résolution des problèmes**

- Identifier la procédure qui n'a pas été menée ou pas correctement menée.
- Les montrer une nouvelle fois si nécessaire.
- Permettre au stagiaire de les répéter si nécessaire.

### **Conclusion**

- Insister sur l'importance des tâches et l'utilisation de la procédure correcte.
- Faire référence à la partie du manuel du stagiaire.
- Le/la remercier pour ses efforts.
- Signer l'enregistrement de la réalisation.
- Fixer une date pour le stage au niveau de compétence supérieur si cela est approprié ou pour un examen de compréhension



# Epointer les dents des porcelets

## Contexte

Les quatre paires de canines des porcelets sont vraiment pointues à la naissance. Il est commun en élevage de porc d'épointer ces dents juste après la naissance, pour réduire les risques de lésions pour la truie et les autres porcelets.

Les porcelets peuvent se battre vigoureusement avant d'établir définitivement l'ordre d'accès aux tétines. Durant ces bagarres la tête des porcelets peut être salement marquée, et être le lieu de départ d'une infection comme la maladie grasseuse des porcs. Les tétines et la mamelle de la truie peuvent aussi être blessées et inflammées. La truie touchée s'agite, peut refuser d'allaiter la portée, écraser des porcelets ou avoir un comportement de cannibalisme envers les porcelets qui essayent de boire.

Epointer les dents des porcelets est souvent considéré comme une mutilation par certains et la réglementation européenne en matière de bien être demande que l'épointage des dents ne soit réalisé que quand les lésions sur les truies et porcelets sont fréquentes et n'ont pu être résolus par d'autres moyens.

De nombreux producteurs essaient de faire une synthèse entre les besoins environnementaux, nutritionnels, sociaux et ont pourtant toujours des problèmes de caudophagie. Tant que le vice n'est pas mieux connu, couper la queue des porcelets reste la meilleure manière de réduire les problèmes.

La section des queues est seulement une des nombreuses opérations que subissent les porcelets. En pratique ils reçoivent en même temps une injection de fer et sont castrés avant d'être reposés dans la case de mise bas. Chez les porcelets adoptés, les bagarres sont plus fréquentes et l'épointage des dents est une pratique essentielle dans les élevages qui pratiquent régulièrement l'adoption.



# Épointer les dents des porcelets

## Procédure

Les aspects importants de la procédure sont les suivants:

**Timing:** L'épointage des dents crée un lieu d'infection potentielle. Le porcelet doit avoir obtenu des immunoglobulines maternelles par le colostrum pour pouvoir faire face à une infection. La meilleure pratique est d'attendre, avant d'épointer les dents, au moins six heures post partum. Ainsi les porcelets ont consommés suffisamment de colostrum. L'idéal est de réaliser la procédure quand les porcelets ont moins de 24 heures. Retarder la date de cette opération entraîne une augmentation de lésions de la mamelle et des porcelets.

**Porcelets petits et faibles:** Les porcelets sont inévitablement affaiblis après l'épointage des dents. Cela ne pose pas de problèmes pour les porcelets forts. Si pour les porcelets petits et faibles l'opération est retardée jusqu'à trois jours, cela augmente leurs chances dans la compétition pour les tétines et donc leur chance de survie.

**Hygiène:** La pince doit être réservée pour cette procédure et ne pas être utilisée pour l'épointage des dents\* ou le soin du cordon ombilical\*.

- Les mains doivent être lavées soigneusement avant de débiter l'épointage des dents
- La pince doit être désinfectée avant et après usage et cela est mieux fait avec de l'eau chaude et savonneuse et une brosse à dents. Une fois propre la pince est stockées dans une boîte avec une solution antiseptique ou de l'alcool à 70° et doit être trempée dans une solution antiseptique ou de l'alcool à 70° entre chaque porcelets.
- Les dents peuvent être cassées ou fendus par une pince émoussée ou endommagée et il peut en résulter une infection. C'est une bonne pratique que de vérifier juste avant l'usage qu'il n'y ait pas de jeu entre les lames de la pince.



# Épointer les dents des porcelets

## Procédure (suite)

**Sécurité de l'opérateur:** La truie devient agitée à cause des cris de porcelets lorsqu'ils sont attrapés et maintenus. Le personnel doit **pendre garde à la truie** durant l'opération et ne pas se mettre dans une position où il pourrait être attaqué. Même les porcelets peuvent mordre. Ils doivent être tenus fermement pour maintenir la bouche ouverte, écarter la langue et mettre les canines dans un bon angle pour couper. Le deuxième ou le troisième doigt peut être utilisé pour limiter les cris du porcelet et réduire l'agitation de la mère, en l'introduisant précautionneusement dans la trachée.

**Les morceaux de dents peuvent voler et entrer dans l'œil d'une personne:** Ce problème peut être résolu en mettant la tête en arrière ou en portant des lunettes de protection lors de l'époinçage des dents

**Minimiser les dommages dans la bouche des porcelets:** Lorsque cette opération est mal effectuée, il y a un risque d'infection de la gencive et d'augmentation de l'incidence des méningites et autres maladies. La plupart des problèmes sont évités par l'utilisation d'une pince aiguisée et propre mais un grand soin devrait être pris lors de l'époinçage des dents pour maintenir la pince parallèle à la mâchoire afin de ne pas blesser la gencive, la langue ou la bouche du porcelet.

**Enregistrement:** Lorsque les dents de tous les porcelets ont été époinçées, noter dans la section soins de **la carte de mise bas** que les dents de la portée ont été époinçées et marquer les porcelets faibles ou petits qui doivent encore l'être.



# Domaine d'activité: Épointer les dents des porcelets

## Questions et réponses

## Cocher les réponses exactes

### Q: Pourquoi les dents sont elles épointées?

- Les canines, dents pointues, peuvent la tête des autres porcelets les luttes pour établir l'ordre d'accès aux tétines
- Elles peuvent aussi durement blesser la tétine ou la mamelle de la truie et la rendre douloureuse. La truie peut refuser d'allaiter la portée

1

2

### Q: Quand les dents doivent-elles être épointées et pourquoi?

- Entre 6 et 24 h post partum
- Avant 6 six heures, les porcelets n'ont pas encore absorber assez de colostrum et risquent plus une infection
- Les canines laissées intactes causent rapidement des lésions à la truie et aux porcelets

3

4

5

### Q: Quelles précautions doivent être prises, en matière d'hygiène, pour prévenir les infections?

- Se laver les mains avant l'opération
- La pince doit être pointue et avoir des tranchants en bon état
- La pince doit être nettoyée avec de l'eau savonneuse et chaude avant et après usage et doit être rangée dans une solution antiseptique ou de l'alcool à 70°
- Elle doit être trempée dans une solution antiseptique ou de l'alcool à 70° entre chaque porcelet

6

7

8

9

### Q: Quelles la position correcte pour la pince pour épointer les dents?

- Parallèle à la gencive

10

### Q: Quelles sont les conséquences d'une mauvaise technique?

- Une infection de la gencive, qui augmente le risque de méningites ou autres maladies

11

### Q: Pour quels animaux l'opération doit être retardée?

- Les petits porcelets et les faibles

12

### Q: Quand les dents des petits porcelets et les faibles doivent-elles être épointés

- A 3 jours

13

Nombre de réponses exactes

Nombre de réponses exactes demandées

9

Visa

Si moins de 9 réponses exactes, fixer la date d'un deuxième entretien

